

▣ Прочитали и одабрали за вас

- За добро зимовање, М. Ћировић..... 208

Пчеле излежене у припремном периоду за зимовање знатно се разликују од летњих пчела: имају већу масу тела, у телу тих пчела повећана је количина суве материје а смањена количина воде, ждрелне жлезде су развијеније и у таквом стању остају до пролећа, масно ткиво и укупна количина резервних храњивих материја већа... Кратко речено, зимске пчеле су физиолошки младе и то својство задржавају до краја живота. Могу да живе од 180 до преко 200 дана. Виталност ових пчела и дуг живот објашњавају се неучешћем у неговању легла и у сакупљању и преради нектара. У последње време поменуте одлике зимских пчела приписују се јувенилном хормону (Јамина Мушинска: „Zimowanie pszczol“, Варшава 1989.) .

▣ Техника пчеларена

- Грабежна пчелињаку, Д. Крецуљ 211

Пчела је инсект који у напорима да обезбеди довољне залихе хране за наступајући зимски период сакупља све слатке материје у природи, од нектара биљака до оштећеног воћа па, ако тога нема, не преже ни од напада на суседне заједнице. Потребе за храном тим су веће што је друштво јаче па су управо јака и снажна друштва склона оваквом

понашању. Колико је велико узбуђење пчела у додиру са заосталим медом познато је сваком пчелару приликом враћања изврцаих рамова у кошнице. Ако се ради непажљиво, ето идеалне прилике да започне грабеж. Само ако има доброг уноса пчеле неће обраћати посебну пажњу на ове рамове. У сваком случају, треба их улагати што касније увече и не остављати дуго изван кошнице.

▣ **Из мог угла**

- Размишљања о узимљавању и зимовању, Р. Радивојац 213

Кад је у питању узимљавање пчела, литература и пракса кажу да припреме почињу концем јула или почетком августа, зависно од подручја гдје се пчелари. То је вријеме кад се допуњавају залихе хране и матица стимулише на што веће залегање. Познато је да пчеле у зиму треба да уђу што бројније. Поставља се питање да ли заиста можемо утицати да матица у том периподу залијеже јаја из којих ће се извести зимске пчеле за које знамо да се и морфолошки разликују од љетних пчела. Могуће је утицати да матица у том периоду развије велике површине легла. Да ли ће зимска пчела бити заступљена у већем или мањем проценту, питање је које тражи одговор. Ово је лако проверити.

▣ **Апиметеоролошка прогноза**, Д. Крецуљ 215

▣ **Вести из Друштва** 216

▣ **Писма читалаца**

