

- Otvoreno gornje leto - pozitivni efekti:

- zimsko klube se pravilno formira u neposrednoj blizini leta na prednjoj strani košnice, gde ima najbolji dotok svežeg vazduha;

- otvorenim gornjim letom obezbedjuje se najbolja ventilacija košnice, a posebno u uslovima velikih snežnih nanosa kada su donja leta zatrpana snegom;

- zbog neposrednog kontakta sa spoljnim temperaturnim uslovima pčele češće izleću na proćisni izlet, ranije poćinju da unose polen, a samim tim imaju i brži prolećni razvoj.

- Otvoreno gornje leto - negativni efekti:

- hladan vetar kroz otvoreno leto rashladjuje pćelinje klube i samim tim se povećava potrošnja hrane u košnici;

- detlićima i žunama je, kroz otvoreno leto, omogućen prolaz da se hrane pćelama i tako uznemiravaju pćele u klubetu;

- zbog direktnog kontakta sa spoljnim okolinom pćele i po nepovoljnim vremenskim uslovima izleću napolje i tako rashladjene padaju i uginjavaju po snegu ili okolnim barama;

- zbog izleta pčela kroz gornje leto podnjače se slabije čiste od uginulih pčela i drugih otpadaka. {jcomments on}